



Chelonia

Corporinoquia
Por una Región Viva

2014



© Chelonia

Apoyando la conservación del
Caimán Blanco o Cocodrilo del Orinoco (*Crocodylus intermedius*)
en los Llanos Orientales de Colombia



Corporinoquia
Por una Región Viva

ENERO 2014



Cría de caimán llanero. Cravo Norte (Arauca)
© Chelonia / Mario Garcés

L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Diciembre

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24/31	25	26	27	28	29

Febrero

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

Festivos

Colombia
España

Colombia
y España

El caimán llanero, caimán del Orinoco o cocodrilo del Orinoco (*Crocodylus intermedius*) es un verdadero cocodrilo (Familia Crocodylidae) y no un caimán (Familia Alligatoridae) como sería la babilla (*Caiman crocodilus*), el caimán negro (*Melanosuchus niger*) o el cachirre (*Paleosuchus* spp.).



Corporinoquia
Por una Región Viva

FEBRERO 2014



Crías de caimán llanero. EBT "Roberto Franco" (Villavicencio - Meta)
© Chelonia / Manuel Merchán

Enero

L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Marzo

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/ 31	25	26	27	28	29	30

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

Festivos

Colombia
España


Colombia
y España

El caimán llanero es la única especie de cocodrilo que se encuentra en una sola cuenca hidrográfica, la Cuenca del Orinoco, compartida por Colombia y Venezuela. Dentro de la cuenca se encuentra en ríos y cuerpos de aguas de la eco-región de los Llanos del Orinoco, que en Colombia se extiende por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada.



Corporinoquia
Por una Región Viva

MARZO 2014



Caimán llanero adulto. Ecoparque Wisirare (Orocué - Casanare)
© Chelonia / Miguel Cárdenas

Febrero

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

Abril

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

L	M	M	J	V	S	D
						2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

Festivos

Colombia y España

El caimán llanero es considerado como uno de los vertebrados más amenazados del mundo, por lo que se encuentra en la categoría de **En Peligro Crítico de extinción (CR)** dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de los Gobiernos de Colombia y Venezuela.



Corporinoquia
Por una Región Viva

ABRIL 2014



Caimán llanero de 240 cm de longitud estimada. Río Vichada (Vichada)
© Chelonia / Fernando Gómez

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Marzo

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

Mayo

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Festivos

Colombia y España
Colombia y España

Se estima que actualmente solo unos 1700 caimanes llaneros sobreviven en estado silvestre en distintos ríos, caños, lagunas y embalses de los Llanos del Orinoco, menos de 200 ejemplares en Colombia y algo más de 1500 individuos en Venezuela.



Chelonia

Corporinoquia
Por una Región Viva

MAYO 2014



Caimán llanero adulto. Ecoparque Wisirare (Orocué - Casanare)
© Chelonia / Antonio Castro

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Abril

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Junio

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24	25	26	27	28	29

Festivos

Colombia
España

Colombia
y España

En la primera mitad del siglo XX, se estima que entre dos y cuatro millones de caimanes llaneros fueron cazados, con mayor intensidad entre los años 1929 y 1934, para el comercio internacional de pieles. Su explotación desmedida redujo rápidamente sus poblaciones y situó a la especie al borde de la extinción.



Corporinoquia
Por una Región Viva

JUNIO 2014



Caimán llanero adulto, Bioparque Los Ocarros (Villavicencio - Meta)
© Chelonia / Manuel Merchán

Mayo

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	19	30	31	

Julio

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24	25	26	27	28	29

Festivos

Colombia y España Colombia y España

En Colombia existen cuatro poblaciones relictas: 1. Sistema de los ríos Cravo Norte-Ele-Lipa-Cuiloto (departamento de Arauca); 2. Ríos Duda y Guayabero (departamento de Meta); 3. Curso medio y bajo del río Vichada (departamento de Vichada); 4. Curso medio del río Meta (en el área de confluencia de los departamentos de Arauca Casanare y Vichada).



Corporinoquia
Por una Región Viva

JULIO 2014



Crías de caimán llanero. Cravo Norte (Arauca)
© Chelonia / Mario Garcés

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Junio

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24	25	26	27	28	29

Agosto

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	26	28	29	30	31

Festivos

Colombia y España


La mayor población colombiana que se encuentra en el departamento de Arauca es la más numerosa, con al menos 50 individuos y 9 eventos reproductivos. Además de en las poblaciones relictas, se tiene constancia de que en otras zonas y ríos llaneros colombianos sobreviven algunos individuos más o menos aislados (río Guarrojo, río Bitá, río Orinoco, curso bajo del río Meta, entre otros).



Chelonia

Corporinoquia
Por una Región Viva

AGOSTO 2014



Bosque galería del río Vichada (Vichada)

© Chelonia / Antonio Castro

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Julio

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Septiembre

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Festivos

Colombia
España

Colombia
y España

Los machos adultos de caimán llanero podían alcanzar longitudes totales de cerca de 7 metros, mientras que las hembras solo llegan hasta cerca de los 3,50 metros. Estas suelen poner entre 20 y 70 huevos en nidos que excavan en playas o bancos de arena a orillas de ríos y caños. Pueden alcanzar edades de más de 60 años.



Chelonia

Corporinoquia
Por una Región Viva

SEPTIEMBRE 2014



Pozo Caimán, Río Vichada (Vichada)
© Chelonia / Fernando Gómez

L	M	M	J	V	S	D	
	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	14
15	16	17	18	19	20	21	21
22	23	24	25	26	27	28	28
29	30						

Agosto

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Octubre

L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Festivos

Colombia
España

Colombia
y España

Las hembras ponen sus huevos entre diciembre y febrero, cuando el nivel de las aguas de ríos y caños es bajo. Los huevos permanecen enterrados entre 80 y 120 días, naciendo las crías entre marzo y mayo, con una longitud de 25 a 30 centímetros. Las hembras pueden permanecer vigilantes en el agua cerca del nido y ayudar a salir a las crías del nido, pudiendo transportarlas al agua en su boca.



Corporinoquia
Por una Región Viva

OCTUBRE 2014



Tormenta sobre el río Meta
© Chelonia / Antonio Castro

Septiembre

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Noviembre

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Festivos

Colombia y España

Los caimanes llaneros adultos se alimentan principalmente de peces, aunque también pueden cazar aves, otros reptiles y mamíferos. Las crías se mantienen generalmente cerca de las orillas con vegetación y se alimentan de insectos, anfibios y crustáceos, fundamentalmente. La madre puede permanecer cerca de ellas hasta durante dos meses desde su nacimiento.



Chelonia

Corporinoquia
Por una Región Viva

NOVIEMBRE 2014



Reserva Natural Palmarito Casanare (Orocué - Casanare)

© Chelonia / Mario Garcés

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Octubre

L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Diciembre

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Festivos

Colombia
España

Colombia
y España

El caimán llanero tiene varias funciones importantes dentro de los ecosistemas llaneros: puede colaborar en la regulación de las poblaciones de peces carnívoros (de los que se alimenta), aporta nutrientes a las aguas (excrementos), evita taponamiento de pozos y caños (por medio de sus desplazamientos) y mantiene un equilibrio en la red trófica o alimentaria.



Corporinoquia
Por una Región Viva

DICIEMBRE 2014



Amanecer sobre el río Meta
© Chelonia / Antonio Castro

Noviembre

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Enero

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Festivos

Colombia y España

La recolección de sus huevos para consumo y de crías para su tenencia o venta como mascotas, la destrucción o alteración de su hábitat, la muerte premeditada o accidental de individuos, cambios en el clima y en la dinámica de los ríos (que pueden provocar la inundación de sus nidos y pérdida de sus huevos) parecen influir negativamente en la recuperación de sus poblaciones.



Corporinoquia
Por una Región Viva



© Chelonia / Mario Garcés

Apoyando la conservación del
Caimán Blanco o Cocodrilo del Orinoco (*Crocodylus intermedius*)
en los Llanos Orientales de Colombia